



循環式(水耕)

水10リットルにつき

日照時間	週	生長段階	
(生長期)	1	発芽・クローン	
	18時間	2*	生長前期
	3*	生長後期	
(開花期)	12時間	4	開花移行期
	5	開花前期	
	6*	開花前期	
	7*	開花中期	
	8	開花中期	
	9	開花後期	
	10	開花後期	
	11	成熟期	
	12	リーチング	

FloraGro	FloraMicro	FloraBloom
ベース肥料*		
6.6ml	6.6ml	6.6ml
26.5ml	19.8ml	6.6ml
26.5ml	26.5ml	13.2ml
19.8ml	19.8ml	19.8ml
6.6ml	19.8ml	26.5ml
6.6ml	19.8ml	26.5ml
6.6ml	19.8ml	33.1ml
6.6ml	19.8ml	33.1ml
-	19.8ml	39.7ml
-	19.8ml	39.7ml
-	13.2ml	39.7ml
-	-	-

RapidStart	Liquid KoolBloom	Floralicious Plus*	FloraBlend	FloraKleen
活力剤など				
6.6ml	-	2.6ml	26.5ml	-
6.6ml	-	2.6ml	26.5ml	-
6.6ml	-	2.6ml	26.5ml	-
2.6ml	-	2.6ml	13.2ml	-
2.6ml	6.6ml	2.6ml	13.2ml	-
2.6ml	6.6ml	2.6ml	13.2ml	-
-	6.6ml	2.6ml	-	-
-	6.6ml	2.6ml	-	-
-	13.2ml	2.6ml	-	-
-	13.2ml	2.6ml	-	-
-	-*	2.6ml	-	-
-	-	-	-	26.5ml

*生長期を延ばす場合は、2週目または3週目の配合を必要だけ繰り返して下さい。
*開花期を延ばす場合は、6週目または7週目の配合を必要だけ繰り返して下さい。

*ベース肥料は必ず水に溶かして混ぜ合わせて下さい。その際、FloraMicroを最初に溶かして下さい。
肥料どうしを直接混ぜ合わせると、生長を阻害する物質を生じる事があります。

活力剤Tips

*Floralicious plus を Floralicious Growth/Bloom のセットに置き換えることもできます。
*成熟期には、Liquid KoolBloomに代えて Dry KoolBloom の追加配合がオススメです。

循環式水耕栽培Tips

培養液を作る際は、FloraMicroを一番最初に水に溶かして下さい。
ココ培地やRO水を使用している場合は、1~2週目にカリマジック(水1Lに対し1.3ml)を配合して下さい。
培養液の温度を24度以下に保って下さい。
培養液の作り置きはできません。作るたびに必ず使い切して下さい。
培養液は1週間から10日のうちに交換して下さい。交換する間、新鮮な水でタンクを満たして下さい。
培養液のpHは、5.5~6.5がベストです。

配合する際の注意

植物は「乾燥・強烈な光源・高温」などの環境によって、通常より多くの培養液を吸収し、肥料焼けを起こす場合があります。そのような環境では薄めの配合を行って下さい。
培養液のpHをしっかりとチェックして下さい。5.5~6.5の間を外れると、植物が栄養分を正常に吸収できなくなります。



非循環・かけ流し(水耕/土耕)

水10リットルにつき

日照時間	週	生長段階	
(生長期)	1	発芽・クローン	
	18時間	2*	生長前期
	3*	生長後期	
(開花期)	12時間	4	開花移行期
	5	開花前期	
	6*	開花前期	
	7*	開花中期	
	8	開花中期	
	9	開花後期	
	10	開花後期	
	11	成熟期	
	12	リーチング	

FloraGro	FloraMicro	FloraBloom
ベース肥料*		
2.6ml	5.3ml	2.6ml
13.2ml	10.6ml	2.6ml
13.2ml	13.2ml	6.6ml
10.6ml	10.6ml	10.6ml
2.6ml	10.6ml	13.2ml
2.6ml	10.6ml	13.2ml
2.6ml	10.6ml	15.9ml
2.6ml	10.6ml	15.9ml
-	10.6ml	21.2ml
-	10.6ml	21.2ml
-	6.6ml	21.2ml
-	-	-

RapidStart	Liquid KoolBloom	Floralicious Plus*	FloraBlend	FloraKleen
活力剤など				
6.6ml	-	2.6ml	13.2ml	-
6.6ml	-	2.6ml	13.2ml	-
6.6ml	-	2.6ml	13.2ml	-
2.6ml	-	2.6ml	6.6ml	-
2.6ml	5.3ml	2.6ml	6.6ml	-
2.6ml	5.3ml	2.6ml	6.6ml	-
-	5.3ml	2.6ml	-	-
-	5.3ml	2.6ml	-	-
-	6.6ml	2.6ml	-	-
-	6.6ml	2.6ml	-	-
-	-*	2.6ml	-	-
-	-	-	-	26.5ml

*生長期を延ばす場合は、2週目または3週目の配合を必要だけ繰り返して下さい。
*開花期を延ばす場合は、6週目または7週目の配合を必要だけ繰り返して下さい。

*ベース肥料は必ず水に溶かして混ぜ合わせて下さい。その際、FloraMicroを最初に溶かして下さい。
肥料どうしを直接混ぜ合わせると、生長を阻害する物質を生じる事があります。

活力剤Tips

*Floralicious plus を Floralicious Growth/Bloom のセットに置き換えることもできます。
*成熟期には、Liquid KoolBloomに代えて Dry KoolBloom の追加配合がオススメです。

非循環・かけ流しTips

培養液を作る際は、FloraMicroを一番最初に水に溶かして下さい。
週に1度、水やりの際に水に混ぜて与えて下さい。
5%~25%の培養液が容器から流れ出るくらいに与えて下さい。
培養液の作り置きはできません。作るたびに必ず使い切して下さい。
ココ培地やRO水を使用している場合は、1~2週目にカリマジック(水1Lに対し1.3ml)を配合して下さい。
培養液の温度を24度以下に保って下さい。
培養液のpHは、5.5~6.5がベストです。

配合する際の注意

植物は「乾燥・強烈な光源・高温」などの環境によって、通常より多くの培養液を吸収し、肥料焼けを起こす場合があります。そのような環境では薄めの配合を行って下さい。
培養液のpHをしっかりとチェックして下さい。5.5~6.5の間を外れると、植物が栄養分を正常に吸収できなくなります。